

対象患者： 大腸がん

レジメン名： アバスチン(5)+FOLFIRI

1コースの日数： 14日

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | Day | | |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|-----|---|----|
| | | | 1 | ～ | 14 |
| 1 | 生食注シリソジ | 10 mL | ○ | | |
| 2 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | |
| 3 | 生理食塩液 ベバシズマブ（遺伝子組換え） | 100 mL 5 mg/kg | ○ | | |
| 4 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | |
| 5 | 5%ブドウ糖液 デキサメタゾン パロノセトロン | 100 mL 6.6 mg 0.75 mg | | ○ | |
| 6 | 5%ブドウ糖液 イリノテカン | 250 mL 150 mg/m ² | ○ | | |
| 7 | 5%ブドウ糖液 レボホリナート | 250 mL 200 mg/m ² | ○ | | |
| 8 | 生理食塩液 フルオロウラシル | 50 mL 400 mg/m ² | ○ | | |
| 9 | 生理食塩液 フルオロウラシル | 100 mL 2400 mg/m ² | ○ | | |
| 10 | 生食注シリソジ | 10 mL | ○ | | |

備考：

Day2,3 デキサメタゾン 8mg 分2（適宜省略可）