

対象患者： 乳がん

レジメン名： Pembrolizumab 【3週毎】 +CBDCA(AUC2)+GEM

1コースの日数： 21日

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | Day | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|---|----|
| | | | 1 | ～ | 8 | ～ | 21 |
| 1 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | | | |
| 2 | 生理食塩液 ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) | 100 mL 200 mg/body | ○ | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | | | |
| 4 | 生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン | 100 mL 6.6 mg 0.75 mg | ○ | | ○ | | |
| 5 | 生理食塩液 ゲムシタビン | 100 mL 1000 mg/m ² | ○ | | ○ | | |
| 6 | 5%ブドウ糖液 カルボプラチニ | 250 mL AUC 2 | ○ | | ○ | | |
| 7 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | ○ | | |

対象患者： 乳がん

レジメン名： Pembrolizumab 【6週毎】 +CBDCA(AUC2)+GEM

1コースの日数： 42日

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | Day | | | | | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|-----|---|---|---|----|---|----|---|
| | | | 1 | ～ | 8 | ～ | 22 | ～ | 29 | ～ |
| 1 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 ペムブロリズマブ (遺伝子組換え) | 100 mL 400 mg/body | ○ | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 デキサメタゾン パロノセトロン | 100 mL 6.6 mg 0.75 mg | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 5 | 生理食塩液 ゲムシタビン | 100 mL 1000 mg/m ² | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 6 | 5%ブドウ糖液 カルボプラチニ | 250 mL AUC 2 | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |
| 7 | 生理食塩液 | 50 mL | ○ | | ○ | | ○ | | ○ | |

備考：

CPS≥10

Pembrolizumab 【3週毎】 : d2-3,9-10 デキサメタゾン錠8mg/分2 (適宜省略可)

Pembrolizumab 【6週毎】 : d2-3,9-10,23-24,30-31 デキサメタゾン錠8mg/分2 (適宜省略可)