

対象患者： 膵がん

レジメン名： オニバイド+5-FU/I-LV療法

1コースの日数： 14日

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む)       | 標準的投与量                           | Day |   |    |
|-----|-------------------------------|----------------------------------|-----|---|----|
|     |                               |                                  | 1   | ~ | 14 |
| 1   | 生食注シリンジ                       | 10 mL                            | ○   |   |    |
| 2   | 5%ブドウ糖液<br>デキサメタゾン<br>グラニセトロン | 100 mL<br>6.6 mg<br>1 mg         | ○   |   |    |
| 3   | 生理食塩液<br>イリノテカン リポソーム製剤       | 500 mL<br>70 mg/m <sup>2</sup>   | ○   |   |    |
| 4   | 生理食塩液                         | 50 mL                            | ○   |   |    |
| 5   | 5%ブドウ糖液<br>レボホリナート            | 250 mL<br>200 mg/m <sup>2</sup>  | ○   |   |    |
| 6   | 生理食塩液<br>フルオロウラシル             | 100 mL<br>2400 mg/m <sup>2</sup> | ○   |   |    |
| 7   | 生食注シリンジ                       | 10 mL                            | ○   |   |    |

備考：

Day2,3 デキサメタゾン 8mg 分2 又は グラニセトロン 2mg 分1

UGT1A1 ホモ接合体あるいは\*6及び\*28ヘテロ接合体の場合

イリノテカン リポソーム製剤は50mg/m<sup>2</sup>、

認容性良好なら2回目以降70mg/m<sup>2</sup>に増量可能