

## エピルビシン+シクロfosファミド（EC）療法を受けられる方へ

	入院（治療前）	治療当日	治療2日目～退院まで
<b>目標</b>	<input type="checkbox"/> 抗がん薬の一般的な副作用症状が理解できる <input type="checkbox"/> 治療の内容、流れ、注意事項がわかる	<input type="checkbox"/> 副作用出現時は医療者へ報告できる <input type="checkbox"/> 副作用症状の予防、対処行動がとれる <input type="checkbox"/> 転倒、転落を予防する行動ができる	<input type="checkbox"/> 副作用症状の予防、対処行動がとれる <input type="checkbox"/> 転倒、転落を予防する行動ができる <input type="checkbox"/> 退院後の生活に向けて準備をすることができる
<b>説明</b>	<input type="checkbox"/> 同意書の確認をします <input type="checkbox"/> 入院生活と治療に関する説明をします （『入院のご案内』を見てください） <input type="checkbox"/> 治療の内容、スケジュール、注意事項を説明します （『がん薬物療法を受けられる方へ』のパンフレットを見てください） <input type="checkbox"/> 副作用の対応策について説明します	<input type="checkbox"/> <b>抗がん薬開始から10分間は安全な投与のために看護師がベッドサイドで観察します</b> <input type="checkbox"/> 抗がん薬治療中に気をつけること、副作用については『がん薬物療法を受けられる方へ』のパンフレットを見てください <input type="checkbox"/> 副作用の対応策について説明します	<input type="checkbox"/> パンフレットを使用して退院後の生活について説明します
<b>処置</b>		<input type="checkbox"/> 点滴の針を入れます <input type="checkbox"/> 点滴終了後、針を抜きます	
<b>活動</b>	<input type="checkbox"/> 安静制限はありません	<input type="checkbox"/> 制限はありませんが、点滴漏れを防ぐためにできるだけ安静にしてください	<input type="checkbox"/> 安静制限はありません
<b>薬剤</b>	<input type="checkbox"/> 入院時に内服薬を確認します	<input type="checkbox"/> <b>抗がん薬治療</b> <b>【① エピルビシン】</b> <b>【② シクロfosファミド】</b> <input type="checkbox"/> 症状に応じて副作用を軽減する薬を使用します	<input type="checkbox"/> 症状に応じて副作用を軽減する薬を使用します
<b>観察</b>	<input type="checkbox"/> 検温 <input type="checkbox"/> 身長測定、体重測定	<input type="checkbox"/> 検温 <input type="checkbox"/> 副作用症状の観察をします <input type="checkbox"/> 点滴の針が入っているところを観察します <input type="checkbox"/> 14時に『私のノート』の記載を確認します	<input type="checkbox"/> 検温 <input type="checkbox"/> 副作用症状の観察をします <input type="checkbox"/> 14時に『私のノート』の記載を確認します
<b>食事</b>	<input type="checkbox"/> 食事制限はありません <input type="checkbox"/> 食べやすい食事に変更できます（看護師にご相談ください） <input type="checkbox"/> 1日1000～1500mlを目安に飲水してください		
<b>清潔</b>	<input type="checkbox"/> シャワー浴ができます		<input type="checkbox"/> シャワー浴ができます

状況に応じて予定が変更になる場合があります。ご不明な点がございましたらお尋ねください

