

周術期の抗血小板剤・抗凝固剤の休薬期間(内服薬)の目安

別添7-1

血栓リスクと出血リスクの組合せにより抗血栓薬の中止の可否を判断ください。

血栓高リスクの場合

別紙「血栓リスク評価の手引き」を参照してください。

(注1) 休薬については、主治医の指示が必要

(注2) 止むを得ず休薬する時は、主治医の指示が必要

※手術の出血リスク分類は、当院「周術期抗血栓薬使用マニュアル」から引用 2022.6改訂

区分	成分名	商品名	手術前休薬時期			添付文書での手術前中止時期
			手術の出血リスク:低 ※ 皮膚科、乳腺外科、形成外科、外来小手術など	手術の出血リスク:中 ※ 消化器外科、婦人科、泌尿器科、呼吸器外科、 頭頸部・口腔外科手術など	手術の出血リスク:高 ※ 頭蓋内、脊髄手術など	
			原則休薬しない (注2)		休薬する (注1)	
抗血小板剤	クロピドグレル	コンプラビン配合	休薬する場合は 14日前 (注2)		14日前 (注1)	14日前
		プラビックス				
		ロレアス配合				
	チクロピジン	パナルジン	休薬する場合は 10~14日前 (注2)		10~14日前 (注1)	10~14日前
	プラスグレル	エフィエント	休薬する場合は 14日前 (注2)		14日前 (注1)	14日前
	チカグレロル	ブリリント	休薬する場合は 5日前 (注2)		5日前 (注1)	5日前
	アスピリン	アスファネート	休薬する場合は 7日前 (注2)		7日前 (注1)	7日前
		イスキア				
		キャプピリン				
		タケルダ				
ニトギス						
バイアスピリン						
バツサミン						
パファリン						
ファモター						
シロスタゾール	シロスレット	休薬する場合は 3日前 (注2)		3日前 (注1)	記載なし	
	プレタール					
	ホルダゾール					
サルボグレラート	アンブラーグ	休薬する場合は 1日前 (注2)		1日前 (注1)	記載なし	
抗凝固剤	ワルファリンカリウム	ワーファリン	4~7日前 (注1) ⇒DOAC又はヘパリンに置換する			日数記載なし
	アピキサバン	エリキューズ	2日前 (注1)			24又は48時間前
	エドキサバン	リクシアナ	1日前 (注1)			24時間前
	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前 (注1)			24時間
	ダビガトラン	プラザキサ	1日前 (注1)	2~4日前 (注1)		24時間又は2日前

兵庫県立がんセンター

以下の医薬品は、抗血小板作用が非常に弱いので、休薬の対象外とする。

成分名	商品名
イコサペント酸エチル	エパデール
	エパロース
イフェンプロジル	セロクラール
イブジラスト	ケタス
オメガ-3脂肪酸エチル (EPA・DHA)	ロトリガ

成分名	商品名
ジピリダモール	ベルサンチン
ジラゼブ	コメリアンコーワ
トラピジル	ロコルナール
トリメタジジン	バスタレルF
ニセルゴリン	サアミオン

成分名	商品名
ベラプロスト	ケアロードLA
	ドルナー
	プロサイリン
	ベラサスLA
リマプロストアルファデクス	オバルモン
	プロレナール

周術期の抗血小板剤・抗凝固剤の休薬期間(内服薬)の目安

別添7-2

血栓リスクと出血リスクの組合せにより抗血栓薬の中止の可否を判断ください。

血栓低リスクの場合

別紙「血栓リスク評価の手引き」を参照してください。

(注1) 休薬については、主治医の指示が必要

※手術の出血リスク分類は、当院「周術期抗血栓薬使用マニュアル」から引用 2022.6改訂

区分	成分名	商品名	手術前休薬時期			2022.6改訂
			手術の出血リスク:低 ※	手術の出血リスク:中 ※	手術の出血リスク:高 ※	
			皮膚科、乳腺外科、形成外科、外来小手術など	消化器外科、婦人科、泌尿器科、呼吸器外科、頭頸部・口腔外科手術など	頭蓋内、脊髄手術など	
			休薬可			
抗血小板剤	クロピドグレル	コンブラビン配合	14日前 (注1)			14日前
		プラビックス				
		ロレアス配合				
	チクロピジン	パナルジン	10~14日前 (注1)			10~14日前
	プラスグレル	エフィエント	14日前 (注1)			14日前
	チカグレロル	ブリリンタ	5日前 (注1)			5日前
	アスピリン	アスファネート	7日前 (注1)			7日前
		イスキア				
		キャブピリン				
		タケルダ				
		ニトギス				
		バイアスピリン				
		パッサミン				
バファリン						
ファモター						
シロスタゾール	シロスレット	3日前 (注1)			記載なし	
	プレタール					
	ホルダゾール					
サルポグレラート	アンブラーグ	1日前 (注1)			記載なし	
抗凝固剤	ワルファリンカリウム	ワーファリン	4~7日前 (注1)			日数記載なし
	アピキサバン	エリキュース	2日前 (注1)			24又は48時間前
	エドキサバン	リクシアナ	1日前 (注1)			24時間前
	リバーロキサバン	イグザレルト	1日前 (注1)			24時間
	ダビガトラン	プラザキサ	1日前 (注1)	2~4日前 (注1)		24時間又は2日前

兵庫県立がんセンター

以下の医薬品は、抗血小板作用が非常に弱いので、休薬の対象外とする。

成分名	商品名
イコサペント酸エチル	エパデール
	エパロース
イフェンプロジル	セロクラール
イブジラスト	ケタス
オメガ-3脂肪酸エチル (EPA・DHA)	ロトリガ

成分名	商品名
ジピリダモール	ペルサンチン
ジラゼプ	コメリアンコーワ
トラピジル	ロコルナール
トリメタジジン	バスタレルF
ニセルゴリン	サアミオン

成分名	商品名
ベラプロスト	ケアロードLA
	ドルナー
	プロサイリン
	ベラサスLA
リマプロストアルファデクス	オパルモン
	プロレナール