兵庫県立がんセンター泌尿器科　共通地域連携パス『前立腺がん/内分泌療法』

様	ID	生年月日

兵庫県立がんセンター

生検日	/ /	歳	内分泌療法　歳
生検時PSA	ng/ml		開始日　/ /
直腸診		（骨EOD分類） 1：5か所以下　2：6-20か所 3：21か所以上　4：Superscan *1/2推1か所	去勢療法
MRI			□ ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ3.6mg　□ ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ10.8mg
TRUS			□ ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ3.75mg　□ ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ11.25mg
転移部位　□リンパ節 □骨 □肺 □肝			□ ゴナックス　□ 両側精巣摘除
その他（　　）			最終投与日(手術日)
骨EOD：（ 0 1 2 3 4 ）			抗ｱﾝﾄﾞﾛｹﾞﾝ剤（ｼﾞｪﾈﾘｯｸ　□可　□不可）
臨床病期（2009年度版）＊右参照	T N M	（臨床病期分類）T1a：切除組織の5%以下 T1b：5%を超えるM1a：所属外リンパ節転移 M1b：骨転移　M1c：それ以外の転移	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ　錠 □ ｵﾀﾞｲﾝ　錠 □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ25　錠
ｸﾞﾘｿﾝｽｺｱ	＋ ＝		特記事項
＜適応条件＞			
□ PSA 4ng/ml以下または付近で安定			
□ パスのIC取得日	/ /		
がん治療連携計画策定料　□ 算定　□ 算定せず			

PSA経過	
測定日	PSA値（Nadir値☑）
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □
/ /	ng/ml □

目標：PSA値　4.0ng/ml以下または付近で安定している
最低3ヶ月ごとのPSA検査
内分泌療法開始後1年ごとに病院へ

連携医療機関（　　）

受診日	注射	内服	症状、処方など	PSA測定日	PSA値
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml
/ /	ｿﾞﾗﾃﾞｯｸｽ □3.6mg □10.8mg ﾘｭｰﾌﾟﾘﾝ □3.75mg □11.25mg ゴナックス □80mg	□ ｶｿﾃﾞｯｸｽ □ ｵﾀﾞｲﾝ □ ﾌﾟﾛｽﾀｰﾙ		/ /	ng/ml

バリアンス

PSA値が最低値から25%以上の上昇（ただし、上昇幅は2ng/ml以上）	バリアンス発生時は主治医の外来予約をお取り下さい。 【連絡先】 兵庫県立がんセンター TEL：078-929-1151　FAX：078-926-5410	担当医	
		担当曜日	□月 □火 □水 □木 □金

次回病院受診日	/ /